

בוגירון

Bogiron 250 EC

בוֹגִירוֹן

תרכיז מתחלב

קוטלי פטריות



רשיון השיירותים להגנת הצומח ולביקורת מס' 04 / הצ / 1794

קוטל פטריות סיסטמי להדברת חלפת ומחלות נוספות בגידולים שונים

אריזה: 1, 5 ליטר

מכיל: 250 גרם difenoconazole בליטר

קבוצה: G1

כללי: בוגירון הוא קוטל פטריות סיסטמי המיועד להדברה של חלפת ומחלות נוף אחרות בגידולי שדה, מטע, ירקות ופרחים.

טבלת הוראות שימוש

הערות	מועד אחרון לטיפול (ימים לפני קטיף)	המינון (ב%) / ריכוז (סמ"ק לדונם)		המחלה	הגידול
		ריסוס בנפח נמוך (עד 100 ל"ד')	ריסוס לנגירה (מעל 100 ל"ד')		
	30	50		חלפת	כותנה
בוגירון ינתן בכל טיפול שני לסרוגין עם תכשירים מקבוצה אחרת. בנגיעות נמוכה ומאוחרת רסס פעם בשבוע. בנגיעות קשה ומוקדמת צופף את הטיפולים עד כדי פעמיים בשבוע. הריסוס - לאחר ההשקייה.	7	75		חלפת	גזר
המינון הגבוה לריסוס בזנים רגישים למחלה, כמו: אלפא, ניקולה, אגריה, רוזוול, ראסט-בורבנק וקוסמוס.	14	50-75		חלפת	תפוח-אדמה
הריסוס נגד סטמפיליום יפחית גם את הנגיעות במחלת החילדון.	30	75		סטמפיליום	שום
בשילוב עם קוטלי תריפסים למניעת "הלבנת קשי".	30	75		סטמפיליום	בצל, עירית, בצל ירוק
בזנים רגישים ובתנאים טובים להתפתחות המחלה יש לרסס במינון 50 סמ"ק / ד'.	7	50-30		אסקוכיטה	חימצה
רסס מדי 7-14 יום לפי עוצמת הנגיעות.	7	100	0.1% (100 סמ"ק ל-100 ליטר מים)	עובש עלים קמחונית	עגבניה
	7	50	0.05% (50 סמ"ק ל-100 ליטר מים)	חלפת	
	14	75		חלפת	אבטיח לגרעינים
רסס מדי שבוע	21	75		חלפת	ברוקולי
רסס מדי שבוע	21	50		צרקוספורה	סלק

תאריך עדכון: יוני 2017

בוגירון

Bogiron 250 EC

בוֹגִירוֹן

תרכיז מתחלב

קוטלי פטריות



המשך מעמוד קודם:

טבלת הוראות שימוש

הערות	מועד אחרון לטיפול (ימים לפני קטיף)	המינון (ב% / ריכוז (סמ"ק לדונם))		המחלה	הגידול
		ריסוס בנפח נמוך (עד 100 ל'ד')	ריסוס לנגירה (מעל 100 ל'ד')		
מומלץ לרסס מדי שבוע. הריסוסים יפחיתו חלפת מומלץ לרסס מדי שבוע. הריסוסים יפחיתו חלפת (Alternaria Alternata) בפרחים פתוחים. אין לרסס בחודשים דצמבר-פברואר.		50		קמחון	גיפסנית
בזנים: סטפני, טוני אדום, רויאלט, אוולין, סמארטי, קרינה, ליאור וברברה. המינון הנמוך מיועד לטיפול מניעה, ובעצמות מחלה נמוכות.		75-100		חלפת	ציפורן
דאג לכיסוי מיטבי של כל הענפים, ובייחוד הפנימיים.		50	0.05% (50 סמ"ק ל-100 ליטר מים)	חלפת קמחנית	פרח השעווה
נותנים 2-3 ריסוסים בחודשים נובמבר, דצמבר ופברואר. הטיפולים ייעשו לאחר המסיק.	90		0.06% (60 סמ"ק ל-100 ליטר מים)	עין הטווס	זית
	14		0.01% (10 סמ"ק ל-100 ליטר מים)	גרב	שסק
רסס מדי 7-14 יום לפי עוצמת הנגיעות. המינון הגבוה - לקמחון.	14		0.01%-0.02% (10-20 סמ"ק ל-100 ליטר מים)	גרב, קמחון בזן ענה	תפוח
יש לשלב עם מרפאן 500 בריכוז 0.25%. יש לתת 2-3 ריסוסים בזמן הפריחה. הראשון - בתחילת פריחה, ואח"כ - כל 6 ימים, בהתאם להתקדמות הפריחה.	14		0.02% (20 סמ"ק ל-100 ליטר מים)	רקבון בית הגרעינים	
רסס בהגיע השריגים לאורך 20-10 ס"מ. בזן קריניאן (ובזנים רגישים אחרים) מקדימים לטפל בהגיע השריגים ל-10 ס"מ.	45		0.015% (15 סמ"ק ל-100 ליטר מים)	קמחון	גפן
בסוף פריחה רסס 2 ריסוסים מדי שבועיים להדברת קמחון בפרי. בחודשים יוני-אוגוסט רסס להדברת קמחון בעלווה. הריסוס יפחית גם את הנגיעות בחלדון.	20		0.02% (20 סמ"ק ל-100 ליטר מים)	קמחון	אפרסק נקטרינה
יש לרסס לפני הגשמים.	45		0.05% (50 סמ"ק ל-100 ליטר מים)	חלפת	אפרסמון

תאריך עדכון: יוני 2017

בוגירון

Bogiron 250 EC

בוֹגִירוֹן

תרכיז מתחלב

קוטלי
פטטריות



רשיון השיירותים להגנת הצומח ולביקורת מס' 04 / הצ / 1794

המשך מעמוד קודם:

טבלת הוראות שימוש

הערות	מועד אחרון לטיפול לפני (קטיף)	המינון (%) / ריכוז (סמ"ק לדונם)		המחלה	הגידול
		ריסוס בנפח נמוך (עד 100 לי/ד')	ריסוס לגירה (מעל 100 לי/ד')		
רסס מדי שבוע	14	50		צרקוספורה חלפת	תבלינים: כוסברה, שמיר, אורגנו, מנטה, רוזמרין, פטרוזיליה, קורנית, בזיל, טרגון, רוקולה
	20				סלרי עלים
	14	50		קמחון	מרווה

תאריך עדכון: יוני 2017

שילובים:

- בכותנה ניתן לשלב בוגירון ת"מ עם אפלורד ת"ר, טלסטאר ת"מ, מוליט ת"ר, מץ' ת"מ, ואטברון ת"מ.
- בגזר ניתן לשלבו עם וורטימק ת"מ ומוליט ת"ר.
- בגפן ניתן לשלב בוגירון ת"מ עם דורסן, דוראון ת"מ, סימבוש ת"מ, טיטאן ת"מ.
- בעגבניה ניתן לשלב בוגירון ת"מ עם ורטימק ת"מ, טריגרד א"ר, מץ' ת"מ ועם מוליט ת"ר.
- בפרחים ניתן לשלב בוגירון עם מוליט ת"ר.
- בחימצה ניתן לשלב בוגירון ת"מ עם דואל גולד ת"מ ועם גאלאנט סופר ת"מ.
- בשאר הגידולים יש לבדוק כל שילוב על קטע קטן לפני ריסוס כל השטח.