



## תכשיר הדברה מיקרוביאלי המכיל בצילוס טורינגיאניזיס (B.t) מאושר גם לחקלאות אורגנית

### אריזה: 5 ק"ג

**מכיל:** 54% בצילוס טורינגיאניזיס מתת-מין קורסטאקי (פעילות של 32.000 יחידות בינלאומיות למיליגרם) ותוצרי תסיסה שונים.

**קבוצה:** 11A

**כללי:** דיפל DF מכיל את נבגי החיידק בצילוס טורינגיאניזיס. בשל פעילותו הספציפית אין דיפל גורם להפרת המאזן הביולוגי בגידולים המרוססים בו. דיפל אינו רעיל לבעלי דם חם, ולכן ניתן לרססו על גידולים חקלאיים עד שלושה ימים לפני בציר או קטיף.

#### אופן היישום

הגידול	המזיק	נפח התרסיס (ל"/ד')	המינון/הריכוז	ימי המתנה	הערות
אבוקדו	אבוקדו 1. עש קליפת ההדר 2. זחלי המודד (בוארמיה) עד גודל 1.5 ס"מ	200 בריסוס מהקרקע 10 בריסוס מסוק שתי וערב	בריסוס מהקרקע: 0.25% נפח התרסיס או 0.5 ק"ג לדונם. בריסוס אוירי: 250 גרם לדונם (125 גרם לדונם בכל אחד משני היעפים)	3	
תפוח, אגס	עש קליפת ההדר עש האשכול	לנגירה	0.25%	3	
תפוח, אגס	עש התפוח	0.125%	100-150	3	2-3 טיפולים בשיא הגחה של הזחלים
אורן	תהלוך האורן	בריסוס מהקרקע: לנגירה בריסוס אוירי: 3 ליטר לדונם	0.05% 50 גרם לדונם	3 3	
גפן	עש האשכול עש קליפת ההדר	לנגירה	0.15%	3	מרססים מהחנטה מדי 2-3 שבועות. יש לדאוג לכיסוי מושלם של האשכולות.
אפרסמון	עש קליפת ההדר		0.15%	3	יש להקפיד על כיסוי מושלם של הפירות.
תות-שדה	עש הרקפת		250 גרם לדונם	3	יש לכוון את התרסיס לבסיסי הצמחים ולדאוג לכיסוי טוב של תחתית הצמח.
רימון	עש התפוח המדומה		0.25% + משטח ביו וואט 0.1%	3	
תירס	גדודית פולשנית (Spodoptera frugiperda)	125 גרם לדונם	30	3	חשוב להקפיד על נפח תרסיס של 30 ל"ד' ולא נמוך מכך בכדי לשיג הדברה יעילה

#### שילובים:

- לשיפור אחיזת התרסיס בעלי אבוקדו בריסוס אוירי רצוי לשלב עם ביו וואט 0.1% או עם "כל פיקס" בריכוז 0.05%