



רשיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 1938/הצ/08

קוטל פטריות משולב להדברת קימחון בגידולים שונים

אריזה: 1 ליטר

מכיל: 100 גר' kresoxim-methyl בליטר 200 גר' boscalid בליטר

קבוצה: C2/H5

כללי: קוליס הינו קוטל פטריות להדברת מחלות הקימחון והחלפת בגידולים שונים. התכשיר מכיל 2 חומרים פעילים מ-2 קבוצות שונות בעלות מנגנון פעולה שונה למניעת התפתחות עמידות. במקומות בהם התפתחה עמידות לחומרים מקבוצת הסטרובילורנים, אין לרסס בקוליס יותר מ-2 טיפולים בעונה ולא ברציפות. במקומות בהם התפתחה עמידות לקוליס על שני מרכיביו אין לרסס בתכשיר. למניעת התפתחות עמידות אין לטפל בקוליס באותה חלקה יותר מ-3 טיפולים בעונה ורצוי לא ברציפות. יעילותו של קוליס היא בטיפולים מונעים להדברת קימחון.

טבלת הוראות שימוש

הגידול	המחלה	המינון/הריכוז		מועד אחרון לטיפול לפני קטיף (ימים)	הערות
		ריסוס לנגירה	ריסוס בנפח קטן		
תפוח	קימחון התפוח	0.03%	-	7	יש לרסס במרווח של 7-14 יום לפי עצמת הנגיעות. אין לטפל יותר מ-3 ריסוסים.
גפן	קימחון הגפן	0.03%-0.05%(1)	-	21	אין לרסס יותר מ-2 טיפולים ולא ברציפות.
מלון, אבטיח, קישוא, דלעת	קימחון הדלועיים	-	50 סמ"ק לדונם	3	אין לטפל יותר מ-2 ריסוסים ולא ברציפות.
נקטרינה, אפרסק	קימחון	0.03%-0.05%(1)	-	14	אין לטפל יותר מ-3 טיפולים בחומר ולא ברציפות.
תות-שדה	קימחון תות שדה	-	50 סמ"ק לדונם	4	אין לטפל יותר מ-3 טיפולים בחומר ולא ברציפות.
גזר	קימחון הגזר, חלפת הגזר	-	50 סמ"ק לדונם	14	אין לרסס יותר מ-3 טיפולים בחומר.
מנגו	קימחון המנגו	0.03%	-	60	-
מלפפון	קימחון הדלועיים	-	50 סמ"ק לדונם	3	אין לרסס יותר מ-3 טיפולים בחומר בעונה.
משמש	קימחון	0.03%	-	14	-

(1) במקומות, בהם יש חשש לפיתוח עמידות, או במקומות בהם יש עדויות על עמידות קימחון לחומרים מקבוצת הסטרובילורנים יש להשתמש במינון גבוה.

שילובים:

- בתפוח - ניתן לשלב קוליס עם נאנובץ ועם אבצאון ת"נ.
- בגפן - ניתן לשלב קוליס עם אוונט, ראנר ודוראון.