מווסתי צמיחה

אגרי-ג'יב 40

Agri-Gibb® 40 SL

أجريجيب

תרכיז נוזלי Soluble Liquid



רשיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת מס':17/הצ/4430

מווסת צמיחה המכיל ג'יברלין

אריזה: 1,5 ליטר

מכיל: 40 גרם חומצה ג'ברלית (GA3) בליטר

כללי: אגרי-ג'יב מווסת צמיחה בתוארית נוזלית לגפן, הדרים, אגס, אפרסמון, פרחים, קינרס וכרפס,
כל 25 סמ"ק אגרי-ג'יב 40 מכילים 1 גרם ג'יברלין.

טבלת הוראות שימוש

הגידול	מטרה	מועד הטיפולים	כמות תכשיר בסמ"ק ל-100 ליטר תמיסה	נפח התרסיס	משטח
ענבים: פרלט סולטנינה תמר בירותי	דילול האשכולות והגדלת הגרגר	1. ב-90%-100% פריחה 2. בגמר חנטה עד 7 ימים לאחר מכן	1. **37-50 סמ"ק** (15-20 חלקי מיליון) 2. **74-100 סמ"ק** (30-40 חלקי מיליון)	הרטבה מלאה	BB-5 בריכוז 0.15% - 0.2% או טריטון x-100 בריכוז 0.025%
			1. **37-50 סמ"ק** (15-20 חלקי מיליון) 2. **74 סמ"ק** (30 חלקי מיליון) 3. **74-100 סמ"ק** (30-40 חלקי מיליון)		
	הגדלה ניכרת של הגרגר	טבילת האשכול כאשר הגרגרים הגיעו לגודל של אפונה	**50 סמ"ק** (20 חלקי מיליון)	הערות: יש להימנע מריסוס הנוף	
הדרים: ולנסיה וושינגטון	צמצום קמטת ("פארוש")	בחודש יולי	**50 סמ"ק** (20 חלקי מיליון)	10-15 ליטר לעץ	BB-5 בריכוז 0.15% לבד או טריטון B 0.025% בתוספת 0.1% חומצה זרחתית או בתוספת אוראה פוספט 50 בריכוז 0.4%
קלמנטינה אור נובה, טופז מינאולה	הגברת חנטה	ריסוס במלוא הפריחה ועד שלב חנטים	**62 סמ"ק** (25 חלקי מיליון)	10-15 ליטר לעץ	טריטון B 0.05% או נוטרקס 0.025%
מינאולה, אשכולית, פומלית		אוקטובר	**12.4 סמ"ק** (5 חלקי מיליון)	500 ליטר לדונם	BB-5 בריכוז 0.15%
אשכולית, פומלו פומלית	שמירת פרי באיסום	טיפול במערך בית אריזה, משולב בתוך הדונג	**125 סמ"ק** (50 חלקי מיליון)	255 סמ"ק לחבית דונג של 200 ליטר	
אגס מגיל 4 ומעלה		בתחילת פריחה מלאה	**37-74 סמ"ק** (15-30 חלקי מיליון)	50-100 ליטר לדונם בהתאם לגודל העץ	טריטון x-100 בריכוז 0.025%

מחוייבים לסביבה | מחוייבים לאיכות | מחוייבים לבטיחות | מחוייבים לפיתוח
Agrica כצטס

מווסתי צמיחה

אגרי-ג'יב 40

Agri-Gibb® 40 SL

أجريجيب

תרכיז נוזלי Soluble Liquid



רשיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת מס':4430/הצ/17

מווסת צמיחה המכיל ג'יברלין

המשך מעמוד קודם:

טבלת הוראות שימוש

הגידול	מטרה	מועד הטיפולים	כמות תכשיר בסמ"ק ל-100 ליטר תמיסה	נפח התרסיס	משטח
אפרסמון (בזן טריומף)	הפחתת נשירת חנטים	בשיא הפריחה - תחילת חנטה	**74 סמ"ק** (30 חלקי מיליון)	עד נגירה	טריטון x-100 בריכוז 0.025%
	הארכת עונת הקטיף וחיי האחסון והמדף	סוף אוקטובר - תחילת נובמבר	**125 סמ"ק** (50 חלקי מיליון)		
אבוקדו צעיר לפני הכנה - עד גיל 4 שנים	הגברת צימוח וצמצום פריחה	2-3 יישומים בעונת הסתיו, בהפרש של חודש לערך	**375-500 סמ"ק** (150-200 חלקי מיליון)	כדי הרטבה מלאה 100-200 ליטר לדונם	BB-5 בריכוז 0.2%
קינרס הזן: סגול בהיר	הקדמת היבול	1. ראשית אוקטובר 2. 21 יום אחר הריסוס הראשון	**75 סמ"ק** (30 חלקי מיליון)	הרטבה מלאה	לרסס אחר השקיה. אין לרסס חלקות שאינן בהתפתחות תקינה, משובשות בעשבים או חולות.
כרפס הזנים: פלורידה, יוטה ו-96	הגברת היבול של חלקות שתאספנה בחודשים פברואר-אפריל בלבד	5 שבועות לפני מועד האסיף המשוער	**75 סמ"ק** (30 חלקי מיליון)	70 ליטר לדונם	
כלנית	הארכת הגבעול	3-4 ריסוסים החל מ: 3-4 שבועות לפני הפריחה	**37-75 סמ"ק** (15-30 חלקי מיליון)	הרטבה מלאה	
אירוס הולנדי	האפלת הפריחה ב -10 ימים והארכת הגבעול בכ -4 ס"מ	סמוך לשתילה	1. **410 סמ"ק** (אחרי קירור רגיל למשך 24 ש') 2. **820 סמ"ק** (אחרי קירור רגיל למשך שעה)	טבילה	