

טופ סידן פלטינום

Top Sidan Platinum™



לשימוש כדשן בריסוס עלוותי
והדשייה להשלמת מחסורים

אריזה: 10 ליטר

הרכב:

7.6%	כלאט סידן (Ca)
0.47%	בורון (B)
1.0%	סיליקון (Si)

מכיל: סידן, סיליקון ובורון בתמיסה אמיתית, בטכנולוגיית PAC*

טבלת מינונים מומלצים

הגידול	מינון בסמק"ד או באחוזים	נפח תרסיס בליטר לדונם	הערות ליישום
תפוח, אגס	0.3%-0.5%	100-300	- לרסס אחרי "פקע-ורוד" - מספר יישומים: 6 עד 12 בהתאם לרגישות הזן למחסור בסידן. - מרווח בין ריסוסים: 7-10 ימים. - במטעים צעירים עם צימוח נמרץ וענפונים מעל 45 ס"מ, יש לרסס לפחות 8 פעמים. - הנפח הנמוך במטעים צעירים ופתוחים, והנפח הגבוה במטעים מבוגרים וסבוכים.
הדרים	0.3%-0.5%	100-300	לרסס אחרי החנטה
רימון	0.3%-0.5%	100-300	למניעת סידוקים בפרי והעלאת איכותו התחל ריסוסים מתחילת חנטה. מספר יישומים 4 עד 6. מרווח בין יישומים: 14 יום. בטיפול הראשון מומלץ לשלב נאנובץ פלטינום להחדרת הסידן לפרי.
מנגו, אבוקדו	0.3%-0.5%	100-300	לרסס בזמן הפריחה ושוב אחרי שבועיים.
משמש, אפרסק, שזיף	0.3%-0.5%	100-300	- לרסס החל מתחילת חנטה. - מרווח בין ריסוסים 14 ימים. - בצע 1-2 יישומים.
גפן	0.3%-0.5%	100-150	- התחל ריסוסים בהגעת הגרגר לגודל אפון - בצע 4-6 ריסוסים - מרווח בין ריסוסים 7-10 ימים.
עגבניה, פלפל	250-400	30-80	- להפחתת שחור-פיטם. - לרסס החל מתחילת חנטה. - מרווח בין ריסוסים 7-10 ימים.
דלועיים	250-400	30-80	- לרסס החל מתחילת חנטה. - מרווח בין ריסוסים 14 ימים.
כרוביים, חסה	250-400	30-80	- התחל ריסוסים עם התחלת גדילת הפרי (ראש). - בצע 2-3 ריסוסים - מרווח בין ריסוסים 7-10 ימים.
סלרי	250-400	30-80	- להפחתת לב-שחור. - לרסס לאחר קליטת השתילים בקרקע. - מרווח בין ריסוסים 7 ימים.

*PAC refers to Nutriag's "Poly Aldo Carbosate" Technology